

ABSTRAK

Tuberkulosis paru adalah tuberkulosis yang menyerang jaringan parenkim paru, tidak termasuk pleura (selaput paru) yang disebabkan oleh *Mycrobacterium tuberculosis* dapat menyerang orang dewasa dan anak-anak. TB Anak adalah penyakit TB yang terjadi pada anak usia 0-14 tahun. Tata laksana tuberkolosis (TB) Anak terdiri atas terapi (pengobatan) dan profilaksis (pengobatan pencegahan). Pemberian dosis antibiotik yang tidak tepat dapat mengakibatkan pasien tersebut gagal mendapatkan pengobatan yang benar terkait penyakitnya, dapat menimbulkan komplikasi berkaitan dengan penyakitnya, menambah biaya pengobatan, serta meningkatnya kejadian resistensi antibiotik.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Penggunaan dan Kesesuaian Dosis Antibiotik Pada Pasien Tuberkolosis Paru Anak di Instalasi Rawat Jalan RSU Aulia Jakarta Selatan Periode Januari 2016 – Agustus 2017. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif .Data penelitian ini diperoleh secara *cross sectional* dengan melihat data sekunder (retrospektif) dari rekam medik pasien anak terinfeksi TB Paru, dengan sampel sebanyak 52 pasien. Hasil penelitian ini adalah pirazinamid sebanyak 20 (56 %) yang dosisnya sesuai, rifampisin sebanyak 21 (47%) pasien yang dosisnya sesuai, dan isoniazid sebanyak 21 (42% pasien yang dosisnya sesuai.