

ABSTRAK

Limfoma Non Hodgkin (LNH) merupakan sekumpulan besar keganasan primer kelenjar getah bening dan jaringan limfoid ekstra nodal, yang dapat berasal dari limfosit B, limfosit T, dan sel NK "natural killer". Kemoterapi adalah proses pengobatan dengan menggunakan obat – obatan yang bertujuan untuk membunuh atau memperlambat pertumbuhan sel – sel kanker. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui demografi pasien meliputi umur dan jenis kelamin, mengetahui gambaran klinik dan mengetahui kemoterapi yang digunakan pada pasien Limfoma Non Hodgkin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah retrospektif dengan melihat data sekunder yang diambil dari rekam medik pasien kanker Limfoma Non Hodgkin di Instalasi Rawat Inap RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Tahun 2015 - 2016. Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin pasien terbanyak adalah laki – laki (65,71%) dan memiliki usia terbanyak pada usia 45 – 54 tahun (31,42%), berdasarkan tipe Limfoma Non Hodgkin yang terbanyak adalah tipe *High Grade Limfoma* (57,14%), dan , berdasarkan penggunaan obat kemoterapi Limfoma Non Hodgkin yang terbanyak adalah CHOP yaitu (54,28%). Dan berdasasarkan regimen dosis yang terbanyak adalah CHOP (54,28%).