

ABSTRAK

Nama : Tamara Puspa Naillah Amalia
Program Studi : Farmasi
Judul : Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap Perilaku
Swamedikasi Obat Antasida untuk Gastritis pada Siswa
SMA Negeri 59 Jakarta

Swamedikasi adalah suatu upaya pengobatan yang dilakukan sendiri terutama untuk mengobati penyakit atau gejala penyakit ringan dan obatnya dapat dibeli bebas tanpa resep dokter. Salah satu penyakit ringan tersebut adalah gastritis, yaitu terjadinya peningkatan produksi asam lambung yang menyebabkan iritasi lambung. Antasida merupakan obat yang biasa digunakan untuk mengatasi gastritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan terhadap perilaku swamedikasi obat antasida untuk gastritis. Penelitian dilakukan dengan metode observasional analitik dan rancangan *cross sectional*. Jumlah sampel sebanyak 292 responden dengan teknik sampling *proportionate stratified random sampling*. Hasil distribusi pengetahuan gastritis kategori baik sebanyak 47,6%, cukup sebanyak 22,9%, dan kurang sebanyak 29,5%. Sedangkan distribusi perilaku kategori baik sebanyak 23,6%, cukup sebanyak 59,9%, dan kurang sebanyak 16,4%. Hasil analisis data menggunakan uji korelasi *Rank Spearman* menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan terhadap perilaku swamedikasi obat antasida untuk gastritis.

Kata kunci:
Gastritis, Pengetahuan, Perilaku, Swamedikasi

ABSTRACT

Name : Tamara Puspa Naillah Amalia
Study Program : Pharmacy
Title : Correlation between Knowledge Level and Antacid Drug
Self-Medication Behavior for Gastritis in SMA Negeri
59 Jakarta Students

Self-medication is an effort to self-medication, especially to treat ailments or symptoms of minor illnesses and the medicine can be purchased freely without a doctor's prescription. One of these mild ailments is gastritis, which is an increase in stomach acid production which causes stomach irritation. Antacids are drugs commonly used to treat gastritis. This study aims to determine the relationship between knowledge and self-medication behavior of antacid drugs for gastritis. The research was conducted with analytic observational method and cross sectional design. The number of samples is 292 respondents using proportionate stratified random sampling technique. The results of the distribution of gastritis knowledge in the good category was 47.6%, sufficient was 22.9%, and less was 29.5%. While the distribution of behavior in the good category was 23.6%, sufficient was 59.9%, and less was 16.4%. The results of data analysis using the Spearman Rank correlation test showed that there was a relationship between knowledge and self-medication behavior of antacids for gastritis.

Keywords:

Behavior, Gastritis, Knowledge, and Self-medication