

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pasien yang menjalani SC didominasi kelompok usia yaitu pada rentang usia 26 – 35 tahun sebanyak 47 pasien (67,14%) dengan paritas ibu dengan primipara <2 anak sebanyak 52 pasien (74,28%). Serta riwayat SC pasien yang tidak pernah melakukan SC sebanyak 47 pasien (67,14%).
2. Pola persepsian obat analgesik untuk pasien pasca Operasi *Caesar* Metode ERACS di RS MMC periode bulan Januari - Juni 2024 didapatkan zat aktif analgesik terbanyak diresepkan adalah analgesik golongan non - narkotik sebanyak 75,4% dengan obat terbanyak Ketoprofen suppositora sebanyak 25% dan obat analgesik terapi kombinasi paling banyak yaitu Ketoprofen suppositoria dan Etoricoxib sebanyak 27,87%.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan terhadap data dalam penelitian diatas, maka dapat diambil saran, sebagai berikut:

1. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut tepat dosis dan kombinasi obat dalam meminimalisir efek samping pada pasien pasca SC ERACS.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut perbedaan biaya antara pasien pasca ERACS dan Non – ERACS.