

ABSTRAK

Skizofrenia merupakan gangguan psikotik yang sering ditandai munculnya gejala berupa gangguan penilaian realita (waham dan halusinasi). Pada skizofrenia terapi farmakologi yang banyak digunakan adalah obat golongan antipsikotik, Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pola persepan antipsikotik pada pasien skizofrenia dengan menggunakan parameter PANSS. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif non eksperimental secara retrospektif dengan melihat Rekam medik pasien Skizofrenia yang menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Khusus Jiwa Dharma Graha Tangerang Selatan selama periode Januari-April tahun 2024. Hasil penelitian diperoleh 100 sampel rekam medis pasien rawat jalan. Pola persepan antipsikotik paling banyak berupa kombinasi Clozapine-Risperidone (18%). Pada hasil efektivitas pola persepan antipsikotik paling besar terhadap penurunan nilai *pre* dan *post* PANSS yaitu Antipsikotik kombinasi Clozapine-Risperidone dengan nilai efektifitas 72 % dan penggunaan obat tambahan paling banyak yaitu obat anti parkinson Trihexyphenidil (23%).

Kata Kunci : Antipsikotik, Efektivitas, PANSS, Skizofrenia.

ABSTRACT

Schizophrenia is a psychotic disorder that is often characterized by the appearance of symptoms in the form of impaired assessment of reality (delusions and hallucinations). In schizophrenia, the pharmacological therapy that is widely used is antipsychotic drugs. The aim of this research is to evaluate the pattern of antipsychotic prescribing in schizophrenia patients using PANSS parameters. This research was carried out using a non-experimental descriptive method retrospectively by looking at the medical records of schizophrenia patients undergoing outpatient treatment at the Dharma Graha Special Mental Hospital, South Tangerang, during the period January–April 2024. The research results were obtained from 100 samples of outpatient medical records. The most common antipsychotic prescribing pattern is a combination of Clozapine-Risperidone (18%). In the results of the effectiveness of the antipsychotic prescribing pattern, the greatest decrease in pre- and post-PANSS scores was the antipsychotic combination Clozapine-Risperidone with an effectiveness value of 72%, and the highest use of additional drugs was the anti-parkinsonian drug Trihexyphenidil (23%).

Keywords: *Antipsychotics, Effectiveness, PANSS, Schizophrenia.*