

ABSTRAK

Nama : Dara Rustri Ardana
Program Studi : Farmasi
Judul : Gambaran Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksin Covid-19 pada Remaja Di SMAIT Raflesia Depok

Penyakit *Coronavirus* (Covid-19) merupakan sebuah penyakit infeksi hingga sampai dengan saat ini sedang menjadi pandemi global. Dalam rangka memantau keamanan vaksin untuk mengatasi pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan melihat serta menganalisis adanya KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) vaksin Covid-19 dari berbagai merek yang ada seperti sinovac, pfizer, astrazeneca dan moderna. guna membandingkan efek yang ditimbulkannya dan apakah terjadi KIPI ringan, sedang atau berat dikalangan remaja yang menerima vaksin Covid-19 saat ini. Metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif observasional. Pengambilan sampel dengan *purposive sampling* dan dilakukan pengisian kuisioner terhadap 236 remaja berusia 16 - 18 tahun. terhadap dengan jumlah sampel 226 orang yang telah memenuhi kriteria inklusi sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian didapat Gejala KIPI sistemik pada vaksinasi pertama mayoritas terjadi ialah mengantuk (56,3%). Gejala KIPI lokal pada vaksinasi pertama mayoritas terjadi ialah nyeri di area bekas suntikkan (53,6%), Gejala KIPI sistemik pada vaksinasi kedua mayoritas terjadi ialah mengantuk (44,54%). Gejala KIPI lokal pada vaksinasi pertama mayoritas terjadi ialah nyeri di area bekas suntikkan (39,09%) Tingkat keparahan KIPI yang terjadi pada remaja di SMAIT Raflesia pasca dilakukannya vaksinasi Covid-19 masuk pada kategori ringan (52,72%).

Kata Kunci : Covid-19, KIPI, Vaksin, Remaja

ABSTRACT

Name : Dara Rustri Ardana

Study Program : Pharmacy

Title : Overview of Adverse Events Following Immunization (AEFI)
Covid-19 Vaccines in Adolescents in SMAIT Raflesia Depok City

Coronavirus disease (Covid-19) is an infectious disease that is currently a global pandemic. In order to monitor the safety of vaccines to overcome the Covid-19 pandemic. This study aims to see and analyze the presence of AEFI Covid-19 vaccines from various existing brands, in order to compare the effects they cause and whether there are mild, moderate or severe AEFIs among adolescents who currently receive the Covid-19 vaccine. Quantitative descriptive research method. This research is analytic with cross sectional design. Sampling by purposive sampling and filling out questionnaires to 236 adolescents aged 16-18 years. with a sample of 226 people who have met the inclusion criteria as research samples. The results showed that the majority of systemic AEFI symptoms in the first vaccination were drowsiness (56.3%). The majority of local AEFI symptoms in the first vaccination occurred were pain at the injection site (53.6%), the majority of systemic AEFI symptoms in the second vaccination were drowsiness (44.54%). The majority of local AEFI symptoms in the first vaccination occurred were pain in the injection site (39.09%). The severity of AEFI that occurred in adolescents at SMAIT Raflesia after the Covid-19 vaccination was in the mild category (52.72%).

Keyword : COVID-19, AEFI, Vaccines, adolescents