

ABSTRAK

Nama : Tuti Herawati Naibaho
Program Studi : Farmasi
Judul : Evaluasi Penggunaan Obat Tukak Peptik pada pasien Tukak Peptik Di Klinik Merdeka Medika Jakarta Selatan Periode Juni – Desember 2020

Tukak peptik adalah gangguan pada saluran gastrointestinal atas yang disebabkan sekresi asam dan pepsin yang berlebihan oleh mukosa lambung (Novi Yana Santika 2019). Penyakit tukak peptik dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti merokok, makanan yang cepat saji, minuman beralkohol, OAINS dan *Helicobacter pylori*. Prevalensi Penyakit ini dapat disebabkan karena penggunaan aspirin (OAINS) dan dapat juga karena infeksi bakteri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi obat yang digunakan dan kerasionalan terapi penggunaan obat pada pasien tukak peptik. Pengumpulan data dilakukan secara retrospektif dengan penyajian data secara deskriptif. Sampel dari penelitian ini diambil menggunakan metode random sampling. Jumlah sampel yang diperoleh yaitu sebanyak 98 pasien. Pada penelitian ini obat yang terbanyak yang digunakan pada pengobatan Tukak Peptik yaitu golongan obat PPI yakni lansoprazole 40 kasus (40%). Berdasarkan hasil penelitian ini kombinasi obat yang paling banyak digunakan adalah Lansoprazole + Domperidon + Sucralfat sebanyak 12 kasus (12%). Evaluasi kerasionalan pada penelitian ini diperoleh tepat indikasi (100%) dan tepat dosis (100%) tepat obat (100%).

Kata kunci: *Tukak Peptik (Tukak Peptik, Jenis Obat, Rasionalitas,)*

ABSTRACT

Name : Tuti Herawati Naibaho
Study Program : Farmasi
Title : Evaluation of the use of peptic ulcer drugs in peptic ulcer patients at the Merdeka Medika Clinic, South Jakarta for the period June – December 2020.

Peptic ulcer is a disorder of the upper gastrointestinal tract caused by excessive secretion of acid and pepsin by the gastric mucosa. Peptic ulcer disease can be caused by several factors, such as smoking, fast food, alcoholic beverages, OAINS and Helycobacter pylori. Prevalence This disease can be caused by the use of aspirin (OAINS) and can also be due to bacterial infection. The purpose of this study was to determine the distribution of drugs used and the rationale of drug use therapy in peptic ulcer patients. Data was collected retrospectively with descriptive data presentation. The sample of this research was taken using random sampling method. The number of samples obtained were 98 patients. In this study, the most commonly used drugs in the treatment of peptic ulcers were PPI drugs, namely lansoprazole 40 cases (40%). Based on the results of this study, the most widely used drug combination was Lansoprazole + domperidone + Sucralfate in 12 cases (12%). Evaluation of rationality in this study obtained the right indication (100%) and the right dose (100%) of the right drug (100%).

Keywords: Peptic Ulcer (Peptic Ulcer, Type of Drug, Rationality,)