

ABSTRAK

Nama : Meypianti
Program Studi : Farmasi
Judul : Tingkat Kepatuhan Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Dalam Penggunaan Obat Antidiabetik di Apotek Kimia Farma 0436 Golden Vienna Periode Januari 2021

Diabetes merupakan penyakit kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Prevalensi diabetes melitus di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada umum ≥ 15 tahun sebesar 2%. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan prevalensi diabetes melitus pada penduduk ≥ 15 tahun pada hasil Riskesdas 2013 sebesar 1,5%. Namun prevalensi diabetes melitus menurut hasil pemeriksaan gula darah meningkat dari 6,9% pada 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*. Sampel dari penelitian ini dengan menggunakan kuesioner *Morisky Medication Adherence Scale-8*. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 70 pasien. Hasil penelitian menunjukkan pasien dengan tingkat kepatuhan rendah sebesar 48,60%, kepatuhan sedang sebesar 28,60%, dan kepatuhan tinggi sebanyak 15%.

Kata Kunci: Diabetes Melitus Tipe 2, Tingkat kepatuhan minum obat, MMAS-8.

ABSTRACT

Name : Meypianti
Program Study : Farmasi
Title : Tingkat Kepatuhan Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Dalam Penggunaan Obat Antidiabetik di Apotek Kimia Farma 0436 Golden Vienna Periode Januari 2021

Diabetes is a chronic disease that occurs when the body cannot produce enough insulin or cannot use insulin effectively. The prevalence of diabetes mellitus in Indonesia based on general doctor's diagnosis ≥ 15 years is 2%. This figure shows an increase compared to the prevalence of diabetes mellitus in people ≥ 15 years in the 2013 Riskesdas results of 1.5%. However, the prevalence of diabetes mellitus according to the results of blood sugar tests increased from 6.9% in 2013 to 8.5% in 2018. This study was a descriptive analytic study using a cross sectional approach. The sample of this study using the *Morisky Medication Adherence Scale-8* questionnaire. The number of samples used was 70 patients. The results showed that patients with a low level of adherence were 48.60%, moderate adherence was 28.60%, and high adherence was 15%.

Keywords : Diabetes Mellitus Type 2, Adherence to taking medication, MMAS-8