

ABSTRAK

Nama : Triolanovita
Program studi : Farmasi
Judul : Pola Terapi Ispa Atas Akut Pada Pediatric Di Puskemas Anggut Kabupaten Bengkulu Selatan Januari-Desember 2019

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) atas adalah infeksi akut yang melibatkan saluran pernapasan bagian atas, seperti hidung, sinus, dan faring. Penelitian ini dilakukan dengan metode *total sampling*. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran penggunaan obat ISPA pada pasien pediatric rawat jalan di Puskemas Anggut kabupaten Bengkulu selatan periode januari-desember 2019. Penelitian non-eksperimental yang menggunakan metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan secara objektif. Data dikumpulkan dari rekam medik pasien di puskesmas anggut. Hasil penelitian menunjukkan yang mengalami ISPA terbanyak berdasarkan kelompok usia adalah usia 1-5 tahun (56,0%), jenis kelamin yaitu laki-laki (44,0%) dan tipe diagnosa ISPA adalah Batuk filek (37,3%) dan Faringitis (23,9%). Penggunaan Antibiotik terbesar yaitu amoxicillin (53,0%), Pola terapi terbanyak yang diberikan adalah (Analgetik/Antipiretik + Antibiotik + Antihistamin + suplemen) 53,7%, (Analgetik/antipiretik + Antibiotik + Ekspektoran) 29,1%, dan (Analgetik/Antipiretik+Antibiotik) 11,9% serta (Analgetik/Antipiretik +Antibiotik + Antihistamin + Ekspektoran + suplemen). Hasil penelitian berdasarkan kerasionalan terapi antibiotik menunjukan bawa pasien pediatrik yang mengalami ISPA di Puskesmas Anggut Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 120 (89,6%) sesuai dalam pemberian dosis dan frekuensi pemberian antibiotik.

Kata Kunci : ISPA, Pediatrik, Pola Terapi,

ABSTRACT

Name : Triolanovita
Study program : Pharmacy
Title : ***Patterns of Acute Upper Ispa Therapy in Pediatrics in Puskemas Anggut, South Bengkulu Regency January-December 2019***

Acute upper respiratory tract infection (ARI) is an acute infection that involves the upper respiratory tract, such as the nose, sinuses and pharynx. This research was conducted with a total sampling method. The aim of the study was to describe the use of ISPA drugs in outpatient pediatric patients at Puskemas Anggut, Bengkulu Selatan district for the period January-December 2019. Non-experimental research using descriptive method is a study conducted to describe or describe a situation objectively. Data was collected from patient medical records at Puskemas Anggut. The results showed that those who experienced the most ISPA by age group were 1-5 years old (56.0%), male gender (44.0%) and the type of diagnosis of ISPA was Coughing Filek (37.3%) and Pharyngitis. (23.9%). The largest use of antibiotics is amoxicillin (53.0%), the most pattern of therapy given is (Analgesics / Antipyretics + Antibiotics + Antihistamines + supplements) 53.7%, (Analgesics / antipyretics + Antibiotics + Expectorants) 29.1%, and (Analgesics / Antipyretics + Antibiotics) 11.9% and (Analgesics / Antipyretics + Antibiotics + Antihistamines + Expectorants + supplements). The results of the study based on the rationality of antibiotic therapy showed that 120 (89.6%) pediatric patients who experienced ARI at the Anggut Health Center in South Bengkulu Regency were according to the dose and frequency of antibiotic administration.

Key Words: ISPA, Pediatric, Pattern Of Therapy.