

ABSTRAK

Nama : Rhine R.Norita Sitinjak
Program Studi : Farmasi
Judul : Pola Penggunaan Obat Antipsikotik Pada Pasien Skizofrenia Paranoid Masa Pandemi Di Poli Psikiatri Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Periode Oktober – Desember Tahun 2020

Skizofrenia merupakan penyakit gangguan otak parah di mana orang menginterpretasikan realitas secara abnormal gangguan pikiran berupa halusinasi, delusi, dan perilaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penggunaan obat antipsikotik pada pasien skizofrenia paranoid masa pandemi di Poli psikiatri Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan pengambilan data secara retrospektif dan data yang didapatkan sebanyak 109 pasien. Hasil penelitian menunjukkan penderita skizofrenia paranoid terbanyak pada kelompok usia 35-44 tahun 56 pasien (51,38%), pada laki-laki 86 pasien (78,90%). Golongan obat yang paling banyak digunakan obat kombinasi dengan jumlah pasien 93 (85,32%). Kombinasi Atipikal 56 pasien (51,36%). Obat-obat penunjang yang juga digunakan sebagai terapi skizofrenia paranoid yang paling sering adalah kombinasi antipsikotik dengan antikolinergik sebanyak 98 pasien (85,96 %). Berdasarkan lama menderita pasien Skizofrenia paranoid 1- 2 tahun sebanyak 32 pasien (29,36%)

Kata kunci : Skizofrenia paranoid, pola penggunaan antipsikotik

ABSTRACT

Name : Rhine R.Norita Sitinjak
Study Program : Pharmacy
Title : Patterns of Antipsychotic Drug Use in Paranoid Schizophrenia Patients during the Pandemic Period at the Psychiatric Outpatient Clinic, Dr. Mental Hospital Soeharto Heerdjan Period October – December 2020

Schizophrenia is a severe brain disorder disease in which people interpret reality in an abnormal way, thought disturbances such as hallucinations, delusions, and behavior. This study aims to determine the pattern of use of antipsychotic drugs in paranoid schizophrenia patients during the pandemic at the Psychiatric Polyclinic of the Outpatient Dr. Mental Hospital. Soeharto Heerdjan. This study is descriptive and retrospective data collection and the data obtained were 109 patients. The results showed that most of the patients with paranoid schizophrenia were in the 35-44 year age group, 56 patients (51.38%), male 86 patients (78.90%). The most widely used group of drugs is combination drugs with a total of 93 patients (85.32%). Atypical Combinations 56 patients (51.36%). Supporting drugs which are also used as therapy for paranoid schizophrenia, the most common is a combination of antipsychotics and anticholinergics as many as 98 patients (85.96%). Based on the length of suffering of paranoid Schizophrenia patients 1-2 years as many as 32 patients (29.36%)

Keywords: Paranoid schizophrenia, pattern of use of antipsychotics