

ABSTRAK

Nama : Erni Choerani
Program Studi : Farmasi
Judul : Gambaran Penggunaan Antipsikotik Pada Pengobatan Skizofrenia di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Periode Januari - Maret 2019.

Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan adanya penyimpangan yang sangat dasar dan adanya perbedaan dari pikiran, disertai dengan adanya ekspresi emosi yang tidak wajar. Skizofrenia sering ditemukan pada lapisan masyarakat dan dapat dialami oleh setiap manusia. Dibanding dengan gangguan mental yang lain, skizofrenia bersifat kronis dan melemahkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran penggunaan obat antipsikotik pada pasien skizofrenia. Penelitian ini merupakan non-eksperimental dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia terbanyak 36-45 (31,3%), jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki (71,7%), penggunaan antipsikotik terbanyak adalah antipsikotik atipikal (66,7%), regimentasi dosis antipsikotik tipikal haloperidol 3x5 mg (14,3%), antipsikotik atipikal clozapine 1x25mg (29,6%) dan antipsikotik kombinasi tipikal+atipikal yaitu haloperidol 3x5 mg (3,4%)+clozapine 1x25 mg (6,8%).

Kata Kunci :
Skizofrenia, antipsikotik, regimen dosis

ABSTRACT

Name : Erni Choerani
Study Program : Pharmacy
Title : Overview of the use of antipsychotic in the treatment of Schizophrenia Patients in Outpatient Installation of South Tangerang City General Hospital Period January - March 2019.

Schizophrenia is a mental disorder characterized by very basic deviations and differences from the mind, accompanied by unnatural emotional expressions. Schizophrenia is often found in community layer and can be experienced by every human being. Compared with other mental disorders, schizophrenia is chronic and debilitating. The purpose of this research is to know the overview of the use of antipsychotic drugs in schizophrenia patients. This research is a non-experimental with descriptive method. The results showed that the most age was 36-45 (31,3%), the most gender was male (71.7%), the most antipsychotic use is atypical antipsychotics (66,7%), regimentation of typical antipsychotic dose of haloperidol 3x5 mg (14,3%), atypical antipsychotic clozapine 1x25mg (29,6%) and antipsychotic typical + atypical combination of Haloperidol 3x5 mg (3.4%) + Clozapine 1x25 mg (6,8%).

Keywords :
Schizophrenia, antipsychotic, dosing regimen