

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Karakteristik usia pasien yang paling banyak terdiagnosa penyakit gagal ginjal kronik non dialisis adalah 46 – 55 tahun sebanyak 50 pasien (43,85%), berdasarkan jenis kelamin laki – laki sebesar 68 (59,65%), berdasarkan penyakit penyerta yang paling banyak hipertensi sebanyak 37 pasien (32,45%), dan berdasarkan stadium gagal ginjal yaitu paling banyak adalah stadium 4, sebanyak 61 pasien (53,50%).
2. Gambaran penggunaan obat terapi pada pasien gagal ginjal kronik non dialisis menunjukkan bahwa penggunaan obat paling banyak adalah obat antianemia sebesar 80 (18,14%) kejadian.
3. Potensi kejadian interaksi obat yaitu sebesar 24 pasien (21,05%) dengan mekanisme terbanyak interaksi obat farmakokinetik sebesar 27 kejadian (65,85%) kejadian antara obat omeprazol dengan CaCo_3 , tingkat keparahan terbanyak minor sebanyak 18 kejadian (43,90%) antara captopril dan furosemid

5.2. Saran

Bagi apoteker dan tenaga kesehatan lainnya perlu ditingkatkan pengetahuan dan peran serta semua pihak terkait di dalam pelayanan kesehatan agar dapat menghindari, mengurangi kesalahan dalam pengobatan terutama potensi interaksi obat yang akan ditimbulkan, serta adanya verifikasi resep meliputi telaah administrasi maupun klinik untuk menghindari adanya potensi interaksi obat.

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan metode prospektif untuk mengetahui efek yang ditimbulkan akibat interaksi obat.