

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan Demografi pasien yaitu usia yang banyak menderita asma adalah usia 0-5 tahun ada 15 orang sebanyak 27% dan pada pasien lansia usia 46-65 tahun ada 14 orang sebanyak 25%. Hal ini menjelaskan teori bahwa kejadian asma tidak terkait dengan usia, asma dapat terjadi pada segala usia. Pada pasien asma berdasarkan jenis kelamin perempuan lebih banyak menderita asma dibanding dengan laki-laki yaitu sebanyak 64%.
2. Pola terapi yang paling banyak digunakan adalah bronkodilator, kortikosteroid dan mukolitik sebanyak 72%. Dan pada pola terapi bronkodilator yaitu salbutamol sebanyak 7%.
3. Dari 55 pasien ditemukan 54 pasien (98%) yang memiliki terjadinya interaksi obat. Obat asma dengan obat asma lainnya yang paling banyak mengalami interaksi adalah salbutamol dan metilprednisolon sebanyak 25 kasus / pasien, sedangkan untuk obat asma dengan obat lain yang paling banyak mengalami interaksi adalah salbutamol dengan chlorpheniramin maleat sebanyak 19 kasus / pasien.

5.2 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian interaksi obat pada pasien rawat inap penderita asma dengan metode prospektif.
2. Bagi institusi / rumah sakit tempat penelitian perlu dilakukan perbaikan pencatatan data rekam medik terkait penggunaan obat pada pasien.