

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai potensi interaksi obat pada pasien penyakit skizofrenia di instalasi rawat inap Rumah Sakit Jiwa Islam Klender periode Juli – Desember 2017, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jenis kelamin terbanyak adalah pasien laki-laki sebanyak 59.78% dan kelompok usia terbanyak adalah kelompok usia 26 – 35 tahun adalah sebanyak 36.87%.
2. Terdapat potensi interaksi obat sebanyak 87.71%, mekanisme interaksi obat terbanyak adalah farmakokinetik sebesar 42.24%. Obat antipsikotik yang banyak mengalami interaksi yaitu clozapine dan risperidon sebanyak 114 kasus.
3. Tingkat keparahan yang paling banyak terjadi pada tingkat moderate (sedang) sebanyak 89.17%. Obat yang paling banyak mengalami tingkat interaksi moderat yaitu clozapine dengan risperidon sebanyak 114 kasus.

#### **5.2 Saran**

1. Diperlukan peningkatan peran apoteker/ farmasis dalam pencegahan terjadinya interaksi obat akibat terapi pengobatan pada pasien skizofrenia, seperti pengaturan dosis, interval pemberian obat dan durasi pengobatan.
2. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian obat pada pasien rawat inap skizofrenia dengan metode prospektif.