

ABSTRAK

Nama : Jeane Victoria Permatasari Marantika
Program Studi : Farmasi
Judul : Evaluasi Terapi Penggunaan Antiretroviral Pada Pasien
HIV/AIDS Rawat Jalan di Rumah Sakit Khusus Daerah
Duren Sawit

Terapi Antiretroviral bertujuan untuk menurunkan angka kematian pada pasien HIV/AIDS dan meningkatkan kualitas hidup.. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dari tahun 2007 – 2017 dengan populasi sebanyak 398 ODHA. Sampel yang didapat sebanyak 90 sampel yang sudah termasuk dalam kriteria inklusi. Jumlah pasien HIV/AIDS terbanyak adalah jenis kelamin laki – laki sebesar 74%, kelompok usia terbanyak yaitu 26 – 35 tahun sebesar 61%, faktor risiko terbanyak yaitu akibat penggunaan jarum suntik NAPZA (IDU) 46.67%. Infeksi oportunistik yang banyak dialami antara lain TB Paru 37%, dan yang tidak mengalami infeksi oportunistik (36%). Gambaran pola terapi ARV terbanyak dengan kombinasi Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine sebesar 39% sebagai terapi awal. Jumlah pasien yang mengalami kenaikan nilai CD4 setelah terapi ARV yaitu 100%.

Kata Kunci :

Terapi Antiretroviral, Kombinasi Obat Antiretroviral

ABSTRACT

Name : Jeane Victoria Permatasari Marantika

Study Program : Pharmacy

Title : Evaluation of The Use of Antiretroviral Therapy in the Patients HIV/AIDS Outpatient in the Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit

Antiretroviral therapy aims to decrease the death rate in patients of HIV/AIDS and improve the quality of life. This research uses descriptive analytic method of the year 2007 – 2017 with a population of 398 PEOPLE LIVING with HIV. Samples obtained as many as 90 samples that are included in the criteria for inclusion. The number of HIV/AIDS patients is the largest gender men amounted to 74%, the largest age group i.e. 26 – 35 years of 61% of most risk factors, namely due to the use of syringes DRUGS (IDU) 46.67%. Opportunistic infection that many experienced Pulmonary TB 37%, and who did not experience opportunistic infections 36%. An overview of ARV therapy in most patterns in combination with Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine in the amount of 39% as initial therapy. The number of patients who experienced a rise in the value of CD4 after 100% of ARV therapy.

Keywords :

Antiretroviral Therphy, Combination Antiretroviral