

ABSTRAK

Nama : Juhaeni Asmarriyah
Program Studi : Farmasi
Judul : Profil Penggunaan Antibiotik Profilaksis Pada Pasien Bedah Sesarea Di Rumah Sakit Pertamina Jaya Periode Januari-Desember 2018.

Bedah Sesarea adalah suatu pembedahan guna melahirkan anak lewat insisi pada dinding abdomen dan uterus. Setiap keadaan yang membuat kelahiran lewat jalan lahir tidak mungkin terlaksana merupakan indikasi absolut untuk Bedah Sesarea. Di Indonesia Bedah Sesarea hanya dilakukan atas dasar indikasi medis tertentu dan kehamilan dengan komplikasi. Hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia (2013) proporsi Bedah Sesarea di Indonesia sebesar 9,8%. Proporsi tertinggi Bedah Sesarea berada di DKI Jakarta sebesar 19,9% dan terendah berada di Sulawesi Tenggara (3,3%) (Riskesdas 2013). Pemberian antibiotik dapat menurunkan resiko infeksi pada luka pasca operasi Bedah Sesarea. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien Bedah Sesarea, dilakukan secara observasional dengan menggunakan metode deskriptif dan data diperoleh dari rekam medis pasien secara retrospektif. Pengambilan data dilakukan teknik *total sampling*. Pasien yang memenuhi kriteria sebagai subjek penelitian sebanyak 84 pasien. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa kejadian operasi Seksio sesarea paling banyak terjadi pada umur 25-29 tahun (34,52%), status gravida G₁PoAo (34,51%), umur kehamilan aterm 38-42 minggu (78,57%), dan lama rawat 2 hari (59,52%). Golongan dan jenis antibiotik profilaksis yang paling banyak digunakan yaitu golongan sefalosporin jenis antibiotik ceftriaxone sebesar (89,28%). dengan dosis 2 gram (85,72%).

ABSTRACT

Name : Juhaeni Asmarriyah
Study program : Pharmacy
Title : Profiles of Prophylactic Antibiotic Use in Caesarean Surgical Patients at Pertamina Jaya Hospital in the January-December 2018 Period.

Caesarean Surgery is surgery to give birth to a child through an incision in the abdominal wall and uterus. Any condition that makes birth through the birth canal impossible is an absolute indication for Caesarean Surgery. In Indonesia Caesarean Surgery is only performed on the basis of certain medical indications and complications of pregnancy. Indonesian Basic Health Research Results (2013) the proportion of Caesarean Surgery in Indonesia is 9.8%. The highest proportion of Caesarean Surgery is in DKI Jakarta at 19.9% and the lowest is in Southeast Sulawesi (3.3%) (Riskesdas 2013). Provision of antibiotics can reduce the risk of infection in postoperative cesarean lesions. This study aims to determine the profile of use Prophylactic antibiotics in Caesarean Surgery patients, performed observatively using descriptive methods and data obtained from the patient's medical record retrospectively. Data collection was performed by total sampling technique. Patients who fulfilled the criteria as study subjects were 84 patients. Data obtained showed that the most cesarean section surgery occurred at age 25-29 years (34.52%), gravida status G₁PoAo (34.51%), gestational age 38 -42 weeks (78.57%), and length of stay 2 days (59.52%). The most widely used prophylactic antibiotic groups and types are cephalosporin ceftriaxone antibiotics (89.28%), with a dose of 2 grams (85.72%)