

ABSTRAK

Nama : Nanda Nurvita Sari
Program Studi : Farmasi
Judul : Gambaran Tingkat Pengetahuan, Perilaku Pencegahan dan Pengobatan terhadap Keputihan pada Remaja Putri di RT 04 Kelurahan Sukamaju Baru, Kota Depok

Keputihan merupakan suatu kondisi normal yang terjadi sebelum dan sesudah menstruasi atau pada masa kehamilan. Keputihan dibagi menjadi 2 jenis yaitu keputihan fisiologis dan patologis. WHO menyatakan sekitar 75% perempuan di dunia pasti mengalami keputihan paling tidak sekali dalam hidupnya, dan 45% akan mengalami 2 kali bahkan lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat pengetahuan, perilaku pencegahan dan pengobatan keputihan pada remaja putri. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan desain *cross-sectional*. Sampel yang digunakan sebanyak 112 responden dan penelitian dilakukan pada bulan Mei 2023. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu tingkat pengetahuan kategori baik (36,6%), kategori cukup (61,6%) dan kategori kurang (1,8%). Perilaku pencegahan yaitu kategori baik (44,6%) dan kategori cukup (55,4%). Perilaku pengobatan yaitu (33,1%) memilih pengobatan herbal, (7,1%) memilih pengobatan non herbal, (2,7%) mengobati dengan memilih keduanya serta (57,1%) tidak melakukan pengobatan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi responden berpengetahuan cukup sebanyak (61,6%), responden berperilaku pencegahan cukup sebanyak (55,4%) dan responden yang melakukan pengobatan keputihan sebanyak (42,9%).

Kata Kunci : keputihan, tingkat pengetahuan, perilaku pencegahan, perilaku pengobatan

ABSTRACT

Name : Nanda Nurvita Sari
Study Program : Pharmacy
Title : Description of Knowledge Level, Behavior of Prevention and Treatment of Leucorrhoea in Young Women in RT 04 Sukamaju Baru Village, Depok City

Leucorrhoea is a normal condition that occurs before and after menstruation or during pregnancy. Leucorrhoea is divided into 2 types, namely physiological and pathological vaginal discharge. WHO states that around 75% of women in the world must experience vaginal discharge at least once in their life, and 45% will experience 2 or more times. This study aims to get an overview of the level of knowledge, behavior in preventing and treating leucorrhoea in young women. The research method uses a descriptive quantitative method with a cross-sectional design. The sample used was 112 respondents and the research was conducted in May 2023. Data processing was carried out using SPSS version 26. The research results obtained were the level of knowledge in the good category (36,6%), the sufficient category (61,6%) and the poor category (1,8%). Prevention behavior is in a good category (44,6%) and sufficient category (55,4%). Treatment behavior, namely (33,1%) chose herbal medicine, (7,1%) chose non-herbal treatment, (2,7%) treated by choosing both and (57,1%) did not take medication. The results of the study can be concluded with the highest percentage of respondents with sufficient knowledge (61,6%), respondents with sufficient preventive behavior (55,4%) and respondents who treated leucorrhoea (42,9%).

Keywords : Leucorrhoea, level of knowledge, prevention behavior, treatment behavior