

ABSTRAK

Nama : Berysa Lestari (18330078)
Program Studi : Farmasi
Judul : Gambaran Efektivitas Obat Pada Pasien Dispepsia Rawat Inap di RSUD Kota Depok

Dispepsia adalah sindrom gastrointestinal bagian atas yang sering terjadi di seluruh dunia. riwayat penyakit, riwayat keluarga, pola hidup, makanan, atau faktor psikologis merupakan faktor yang berkaitan dan dapat terjadinya kekambuhan, yang membuat kualitas hidup penderita menurun. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran karakteristik dan penggunaan obat pada pasien dispepsia di instalasi rawat inap RSUD Kota Depok dengan metode *cross sectional* dengan metode pengambilan data secara retrospektif melalui rekam medik pasien. Pemilihan sampel menggunakan teknik *total sampling* dimana terdapat 99 sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Jenis kelamin terbanyak adalah perempuan (58%) dan rentang usia 12-25 (31,3%) dengan rata-rata lama rawat 4-6 hari (69,7%). Penggunaan obat dispepsia terbanyak adalah 2 kombinasi (47,5%) dengan jenis obat terbanyak golongan PPI (30,1%). Nilai p value $>0,005$ pada uji statistik memperlihatkan bahwa penggunaan obat dispepsia tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan hari lama rawat. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan obat dispepsia tidak mempengaruhi lama hari rawat pasien dispepsia.

Kata Kunci: Dispepsia, hari lama rawat, penggunaan obat dispepsia

ABSTRACT

Name : Berysa Lestari (18330078)
Study Program : Pharmacy
Title : Description of Drug Effectiveness in Inpatient Dyspepsia
Patient at Depok City Hospital

Dyspepsia is an upper gastrointestinal syndrome that occurs frequently throughout the world. medical history, family history, lifestyle, diet, or psychological factors are related factors and recurrence can occur, which decreases the patient's quality of life. This study was conducted to describe the characteristics and use of drugs in dyspepsia patients at the inpatient installation of Depok City Hospital using the method cross sectional with retrospective data collection method through patient medical records. Selection of samples using techniques total sampling where there were 99 samples that met the inclusion criteria. The most gender was female (58%) and the age range was 12-25 (31.3%) with an average length of stay of 4-6 days (69.7%). The most use of dyspepsia drugs was 2 combinations (47.5%) with the most types of drugs belonging to the PPI group (30.1%). The p-value >0.005 in the statistical test shows that the use of dyspepsia drugs does not have a significant relationship with the length of stay. It can be concluded that the use of dyspepsia drugs does not affect the length of stay of dyspepsia patients.

Keywords: Dyspepsia, length of stay, use of dyspepsia drugs