

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pasien GERD lebih banyak diderita oleh Wanita (59,8%) dari pada laki-laki (40,2%), usia yang paling banyak menderita GERD adalah 10-25 tahun (37,3%), pemberian dosis ranitidine kepada pasien didominasi oleh pasien yang memperoleh penggunaan dosis yang tepat (58,8%), pada pasien gerd (52,0%) frekuensi pemakaian ranitidine perhari didominasi oleh penggunaan yang kurang tepat dan pada (52,9%) pasien GERD lama pemberian ranitidine sudah tepat. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa aspek penggunaan ranitidin yang perlu ditingkatkan. Meskipun dosis ranitidin cukup tepat, frekuensi pemakaian dan lama pemberian masih belum optimal. Sebagian besar responden menggunakan frekuensi dan lama pemberian yang kurang sesuai.

5.2 Saran

1. Untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut mengenai rasionalitas penggunaan obat GERD dan dapat melengkapi beberapa kekurangan dalam penelitian ini, seperti dengan menambahkan kombinasi obat lain sebagai perbandingan, untuk menilai rasionalitas pengobatan GERD.
2. Dapat dilakukan pengembangan penelitian tentang faktor-faktor pemicu yang menyebabkan terjadinya GERD
3. Untuk puskesmas Tanjung Mas Makmur agar dapat dilakukan monitoring dan penyuluhan terkait Gerd dan penggunaan obatnya, serta terus memberikan edukasi kepada pasien dan mencegah terjadinya efek samping pada pasien.