

ABSTRAK

Nama : Adha Maria Kusuma Wardani

Program Studi: Farmasi

Judul : Profil Penggunaan Obat Antipsikotik Pada Pasien Skizofrenia di
Rawat Jalan Instalasi Farmasi RSJ Dr. Soeharto Heerdjan
Periode Juli-Desember Tahun 2022

Skizofrenia merupakan salah satu gangguan psikosis yang mengacaukan kejiwaan seseorang berupa penyimpangan sikap, pikiran, dan perilaku. Salah satu penanganan skizofrenia adalah dengan terapi farmakologi menggunakan antipsikotik untuk mengatasi gejala yang timbul. Penelitian ini bertujuan untuk melihat profil penggunaan antipsikotik pada pasien skizofrenia rawat jalan Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta serta melihat rasionalitas obat meliputi tepat pasien, tepat obat, tepat indikasi, dan tepat dosis penggunaan obat. Penelitian ini menggunakan teknik *cross sectional*, yaitu pengamatan data hanya satu kali pada saat yang bersamaan. Data sekunder yang digunakan diambil dari rekam medis 318 pasien berusia 12-65 tahun periode Juli–Desember 2022. Dari sampel penelitian, skizofrenia lebih banyak dialami oleh laki-laki (61,6%), perempuan (38,4%), dan frekuensi usia terbanyak 36-45 tahun (33,0%). Tipe skizofrenia yang paling banyak diderita adalah tipe paranoid sebanyak (74,1%). Profil penggunaan antipsikotik terbanyak adalah golongan antipsikotik atipikal sebesar (70,4%), golongan tipikal sebesar (29,6%), dan antipsikotik kombinasi terbanyak Atipikal-Atipikal sebanyak (69%), Atipikal-tipikal sebanyak (29%) serta tipikal-tipikal (2%). Hasil penelitian menunjukkan tingkat ketepatan penggunaan antipsikotik yaitu kategori tepat obat, tepat pasien (100%), tepat obat (99.1%), tepat indikasi (100%), dan tepat dosis (97,5%) Kesimpulan: evaluasi penggunaan obat perlu dilakukan selama pasien dirawat jalan karena terdapat ketidaktepatan dosis pada penggunaan obat antipsikosis.

Kata kunci: Skizofrenia, Karakteristik, Antipsikotik, profil penggunaan, Rasionalitas

ABSTRACT

Name : Adha Maria Kusuma Wardani

Study Program : Pharmacy

Title : Usage Profile of Antipsychotic Drugs in Schizophrenic Outpatients at Pharmaceutical Installation of RSJ Dr. Soeharto Heerdjan in July to December 2022

Schizophrenia is a psychotic disorder that disrupts a person's psyche through deviations in attitudes, thoughts, and behavior. One of the treatments for schizophrenia is pharmacological therapy using antipsychotics to treat the symptoms. This study aims to examine the profile of antipsychotic use in schizophrenic outpatients at Dr. Suharto Heerdjan Jakarta and assess the rationality of drugs, including the right patient, the right drug, the right indication, and the right dose of drug use. This study used a cross-sectional technique, namely observing data at a single point in time. The secondary data was taken from the medical records of 318 patients aged 12-65 years from July to December 2022. From the research sample, schizophrenia is more common in men (61.6%), women (38.4%), and the highest frequency was 36-45 years (33.0%). The most common type of schizophrenia is paranoid (74.1%). The most used antipsychotic profiles were atypical antipsychotics (70.4%), typical groups (29.6%), and combination antipsychotics, with the most number of Atypical-Atypical (69%), Atypical-typical (29%) and typical-typical (2%). The results showed the level of accuracy in using antipsychotics, namely the right category of drug, the right patient (100%), the right drug (99.1%), the right indication (100%), and the right dose (97.5%). Conclusion: Evaluation of drug use is necessary when treating outpatients due to an inaccuracy in the dosage of antipsychotic drugs.

Keyword: Schizophrenia, Characteristics, Antipsychotics, use profile, Rationality