

ABSTRAK

Nama : Usi Dwi Meika
Program Studi : Farmasi
Judul : Gambaran Penggunaan Obat Antihipertensi Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Prikasih Jakarta Selatan Periode Juli-Desember Tahun 2022

Penyakit hipertensi semakin serius karena tingkat penderitanya terus meningkat, menjadi penyebab kematian dini terbesar ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi di Rumah Sakit Prikasih selama Juli-Desember 2022. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dan pendekatan *Cross-sectional*, sampel dipilih melalui purposive sampling. Hasilnya mengungkapkan bahwa pasien hipertensi cenderung berusia 55-65 tahun (45,10%), sebagian besar perempuan (58,82%), dan mengidap penyakit penyerta seperti diabetes mellitus (18,63%). Terapi antihipertensi paling umum adalah golongan CCB (46,63%) dengan Amlodipin sebagai obat paling banyak digunakan (40,45%). Pola pengobatan antihipertensi umumnya terdiri dari terapi tunggal (45,10%), dengan Amlodipin sebagai terapi utama (35,29%). Penggunaan kombinasi dua obat antihipertensi mencapai (35,29%), dengan golongan CCB dan Beta Bloker sebagai yang paling umum (12,75%). Pola tiga kombinasi obat antihipertensi mencapai (19,61%), dengan kombinasi ARB, CCB, dan Beta Bloker menjadi yang paling umum (6,86%).

Kata Kunci : Hipertensi, Pola Penggunaan, Antihipertensi dan Pasien

ABSTRACT

Name : Usi Dwi Meika
Major : Farmasi
Title : Overview of the Use of Antihypertensive Drugs in Outpatients at Prikasih Hospital, South Jakarta for the Period July-December 2022

Hypertensive disease is increasingly serious because the rate of sufferers continues to increase, becoming the third largest cause of premature death. This study aims to understand the pattern of antihypertensive drug use in hypertensive patients at Prikasih Hospital during July-December 2022. The study was conducted using descriptive method and Cross-sectional approach, the sample was selected through purposive sampling. The results revealed that hypertensive patients tended to be aged 55-65 years (45.10%), mostly female (58.82%), and had comorbidities such as diabetes mellitus (18.63%). The most common antihypertensive therapy was the CCB class (46.63%) with Amlodipine as the most widely used drug (40.45%). The antihypertensive treatment pattern generally consisted of single therapy (45.10%), with Amlodipine as the main therapy (35.29%). The use of a combination of two antihypertensive drugs reached (35.29%), with CCBs and beta blockers being the most common (12.75%). The pattern of three antihypertensive drug combinations reached (19.61%), with the combination of ARBs, CCBs, and Beta Blockers being the most common (6.86%).

Keywords: Hypertension, Use Patterns, Antihypertensives and Patients