

ABSTRAK

Nama : Fajriana Putri Pradini
Program Studi : Farmasi
Judul : Evaluasi Penggunaan Obat Bipolar Pada Pasien Bipolar
Periode Januari-Desember 2022 Di Instalasi Rawat Jalan
Rumah Sakit Jiwa Islam Klender

Gangguan bipolar adalah gangguan yang ditandai adanya perubahan yang sangat ekstrim pada suasana perasaan, yaitu berupa mania dan depresi. Riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2018 menunjukkan kejadian gangguan jiwa berat seperti bipolar di DKI Jakarta sebesar 10,1%. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran karakteristik pasien, gambaran penggunaan obat, serta ketepatan pengobatan gangguan bipolar pasien rawat jalan RS Jiwa Islam Klender 2022. Penelitian ini bersifat deskriptif (non-eksperimental) pengambilan data dilakukan secara retrospektif dengan metode *Total Sampling* dari rekam medik 76 pasien gangguan bipolar di Instalasi Rawat jalan Rumah Sakit Jiwa Islam Klender periode Januari-Desember 2022 yang dianalisis dengan melihat angka kejadian kerasionalan pengobatan berdasarkan parameter indikator seperti tepat obat, tepat pasien dan tepat dosis. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 76 pasien pasien jenis obat yang paling banyak digunakan adalah valproat 24,48%. Golongan obat yang paling banyak digunakan yaitu antipsikotik atipikal 45,39% dengan penggunaan terbanyak yaitu aripiprazole 12,75%. Pemberian terapi farmakologi pada pasien gangguan bipolar di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Jiwa Islam Klender periode Januari-Desember tahun 2022 yaitu tepat obat sebesar 76,31%, tepat pasien sebesar 100%, dan tepat dosis sebesar 97,36%.

Kata kunci: Gangguan bipolar, evaluasi penggunaan obat, tepat obat, tepat pasien, tepat dosis

ABSTRACT

*Name : Fajriana Putri Pradini
Study Program : Pharmacy
Title : Evaluation the Use of Bipolar Drugs in Bipolar Patients for Period January - December 2022 at the Outpatient Installation of the Klender Islamic Mental Hospital*

Bipolar disorder is a disorder characterized by extreme changes in mood, in the form of mania and depression. The 2018 Indonesian Basic Health Research showed that the incidence of severe mental disorders such as bipolar in DKI Jakarta was 10.1%. This study was conducted to determine the description of patient characteristics, description of drug use, and accuracy of treatment of bipolar disorder in outpatients of Klender Islamic Mental Hospital 2022. This study is descriptive (non-experimental) data collection was carried out retrospectively with the Total Sampling method from the medical records of 76 bipolar disorder patients at the Klender Islamic Mental Hospital Outpatient Installation for the period January-December 2022 which was then analyzed by looking at the incidence of treatment rationality based on the parameters of treatment rationality indicators such as the right drug, the right patient and the right dose. The results showed that out of 76 patients, the type of drug most widely used was valproate 24.8%. The most widely used drug group is atypical antipsychotics 45.39% with the highest use of aripiprazole 12.75%. The provision of pharmacological therapy in patients with bipolar disorder in the outpatient installation of the Klender Islamic Mental Hospital for the period January-December 2022, namely the right drug by 76,31%, the right patient by 100%, and the right dose by 97.36%.

Keywords: Bipolar disorder, medication evaluation, appropriate drug, appropriate patient, appropriate dose