

ABSTRAK

Nama : Vidya Retno Prabandari
Program Studi : Farmasi
Judul : Pola Terapi Obat Dispepsia Pada Pasien Dewasa Di Poli Klinik
Penyakit Dalam Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan
Antariksa Periode Januari – Desember 2021

Dispepsia merupakan rasa nyeri perut bagian atas yang tidak nyaman pada bagian ulu hati, kembung, mual dan muntah serta perut terasa begah. Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 mencatat pasien dispepsia rawat jalan di puskesmas sebesar 486.780 pasien dan di RSUD sebesar 47.444 pasien. Penyakit dispepsia di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Jakarta Timur menempati urutan ke-10 penyakit terbanyak sebesar 127 kasus pada bulan Juni 2021. Untuk kasus dispepsia di poli penyakit dalam tercatat sebanyak 979 kasus atau sebesar 7% dari kasus penyakit di rawat jalan tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui demografi pasien, penyakit penyerta, pola terapi dan jenis kombinasi obat dispepsia pada pasien di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa periode Januari–Desember 2021. Penelitian ini menggunakan metode observasi yang bersifat deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif dimana seluruh data rekam medik dan sampel yang termasuk kriteria inklusi sebanyak 80 sampel. Hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin diperoleh persentase terbanyak adalah perempuan 52 pasien (49%), berdasarkan usia diperoleh persentase terbanyak adalah kelompok usia 56-65 tahun sebanyak 39 pasien (49%) dan berdasarkan penyakit penyerta, hasil terbanyak adalah hipertensi sebanyak 11 pasien. Berdasarkan pola terapi obat dispepsia, terapi tunggal hasil terbanyak menggunakan penghambat pompa proton yaitu lansoprazole 30mg sebanyak 20% dan omeprazole 20mg sebanyak 20%. kombinasi terapi obat dispepsia yang digunakan pada pasien di poliklinik penyakit dalam Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa terbanyak yaitu dengan terapi kombinasi penghambat pompa proton (lansoprazol 30mg) + pelindung mukosa (sucralfat sirup) sebanyak 20 pasien (34%) dan penghambat pompa proton (lansoprazol 30mg) + prokinetik (domperidone 10mg) sebanyak 13 pasien (21%).

Kata Kunci :

Dispepsia, Pola Terapi, Kombinasi Obat

ABSTRACT

Name : Vidya Retno Prabandari
Study Program : Pharmacy
Title : *The Pattern of Dyspepsia Drug Therapy in Adult Patients in the Internal Medicine Clinic at the Air Force Hospital dr. Esnawan Antariksa Period January – December 2021*

Dyspepsia is an uncomfortable upper abdominal pain in the pit of the stomach, bloating, nausea and vomiting and a feeling of bloating in the stomach. Based on data from the DKI Jakarta Provincial Government in 2020, there were 486,780 outpatient dyspepsia patients in public health center and 47,444 patients in regional public hospitals. Dyspepsia in the Air Force Hospital dr. Esnawan Antariksa East Jakarta ranks 10th with the most diseases with 127 cases in June 2021. For dyspepsia cases in the internal polyclinic, there were 979 cases or 7% of outpatient disease cases in 2021. This study aims to determine patient demographics, comorbidities, therapeutic patterns and types of dyspepsia drug combinations in patients at the Air Force Hospital dr. Esnawan Antariksa for the period January–December 2021. This study uses a descriptive observation method with retrospective data collection where all medical record data and samples including inclusion criteria are 80 samples. The results of the study based on gender, the highest percentage was female 52 patients (49%), based on age, the highest percentage was in the 56-65 year age group of 39 patients (49%) and based on comorbidities, the highest result was hypertension as many as 11 patients. Based on the pattern of dyspepsia drug therapy, the single therapy with the most results used proton pump inhibitors, namely lansoprazole 30mg as much as 20% and omeprazole 20mg as much as 20%. combination therapy for dyspepsia drugs used in patients in the internal medicine polyclinic of the Air Force Hospital, dr. Esnawan Antariksa was treated with a combination of proton pump inhibitors (lansoprazole 30mg) + mucosal protection (sucralfat syrup) in 20 patients (34%) and proton pump inhibitors (lansoprazole 30mg) + prokinetics (domperidone 10mg) in 13 patients (21%).

Keywords :

Dyspepsia, Pattern Therapy, Combination Therapy