

ABSTRAK

Nama : Nova Lianda
Program studi : Farmasi
Judul : “ Perbandingan Kepatuhan Pasien Pada Terapi Antiretroviral (ARV) Berdasarkan Indikator Kewaspadaan Dini di Puskesmas Kecamatan Gambir Tahun 2017 – 2019”

Jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia hingga tahun 2018 mencapai 640.443 jiwa. Secara Nasional, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kasus HIV/AIDS tertinggi di Indonesia mencapai 55.099 jiwa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan kepatuhan pasien dengan terapi Antiretroviral (ARV) berdasarkan indikator kewaspadaan dini. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data retrospektif tahun 2017-2019 di Puskesmas kecamatan Gambir. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non random. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbandingan kepatuhan pasien dengan terapi Antiretroviral berdasarkan Pengambilan obat ARV tepat waktu memiliki tingkat kepatuhan Sedang 89,60%, retensi dalam perawatan HIV memiliki tingkat kepatuhan Baik 97,16%, keberlangsungan suplai obat ARV 100% dan praktek pemberian obat ARV 0% yaitu memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi pelayanan kesehatan untuk lebih ditingkatkan.

Kata kunci:

Indikator kewaspadaan dini, Terapi Antiretroviral

ABSTRACT

Name : Nova Lianda
Study program : Pharmacy
Title : "Comparison of Patient Adherence to Antiretroviral Therapy (ARV) Based on Early Warning Indicator's at Gambir Sub-District Health Center Year 2017 - 2019"

The number of HIV / AIDS sufferers in Indonesia until 2018 reaches 640.443 people. Nationally, DKI Jakarta is a province with the highest HIV / AIDS cases in Indonesia reaching 55,099 people. This research was conducted to determine the description of patient compliance with antiretroviral therapy based on early alert indicators. This research is quantitative descriptive using retrospective data for the 2017-2019 period at the Gambir sub-district health center. The sampling technique used is non random. The results of this study show a picture of patient adherence to antiretroviral therapy based on timely ARV drug intake having a moderate compliance rate of 89.60%, retention in HIV care having a good adherence rate of 97.16%, continuity of ARV drug supply 100% and practice of giving ARV drugs 0%, which has a high level of compliance. The results of this study can be a picture for health services to be further improved.

Keywords:

Early warning indicator's, Antiretroviral therapy