

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pasien penderita stroke iskemik di instalasi rawat inap di RSUD Budhi Asih pada tahun 2017 memiliki jumlah pasien laki-laki terbanyak yaitu 38 pasien (56,72%). Pasien stroke iskemik terbanyak terjadi pada rentang usia 50-59 tahun yaitu 25 pasien (37,31%).
2. Jenis obat antihipertensi yang paling banyak digunakan pada pasien stroke iskemik di instalasi rawat inap RSUD Budhi Asih yaitu pengobatan tunggal amlodipin sebanyak 24 pasien (35,82%)
3. Kejadian interaksi obat berdasarkan mekanisme interaksi obat yang paling banyak terjadi adalah farmakodinamik sebanyak 75 kasus (71,55%), lalu kejadian interaksi obat berdasarkan tingkat keparahan yang paling banyak terjadi adalah moderate sebanyak 104 kasus (89,66%) dan interaksi obat yang paling banyak terjadi adalah amlodipine dengan aspirin yaitu sebanyak 23 kasus (19,83%).

5.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Sebaiknya dalam penulisan data rekam medik pasien dilakukan selengkap mungkin.
2. Perlu dilakukan penelitian interaksi obat secara prospektif, sehingga dapat diketahui efek yang ditimbulkan akibat interaksi obat.