

ABSTRAK

Nama : Sri Lan Yunita
Program Studi : Farmasi
Judul : Pola Terapi Diare Akut Pada Pasien Pediatri Rawat Inap Di
Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Jakarta Timur
Periode Januari – Desember 2019.

Diare merupakan suatu kondisi dimana individu mengalami buang air dengan frekuensi sebanyak 3 atau lebih per hari dengan konsistensi tinja dalam bentuk cair, merupakan gejala infeksi saluran pencernaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penggunaan obat antidiare pada pasien pediatri di RSUD Budhi Asih, yang dilakukan secara retrospektif dengan rancangan deskriptif menggunakan data rekam medis pasien pediatri yang menderita diare akut yang menggunakan terapi diare selama periode Januari – Desember 2019. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk persentase dan tabel. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari 110 pasien yang paling banyak menderita diare adalah berjenis kelamin laki-laki 56%; berdasarkan usia yang paling banyak menderita diare adalah kelompok umur 1-5 tahun 69%; berdasarkan masa rawat yang terbanyak adalah pada range masa rawat $\geq 3-7$ hari 81,8%; dan berdasarkan jenis cairan elektrolit adalah IVFD Asering 33,6% pada usia 1-5 tahun. Berdasarkan penggunaan obat paling sering diberikan adalah probiokid 85,5%; Parasetamol 73,6%; zink 67,3%; IVFD Asering 50,9%; dan pola terapi yang sering digunakan adalah Cairan elektrolit + Antipiretik + Probiotik + Suplemen 26,4%.

Kata kunci : Diare, Pediatri, Pola Penggunaan Obat antidiare

ABSTRACT

Name : Sri Lan Yunita
Study Program : Pharmacy
Title : *Pattern of Acute Diarrhea Therapy in Pediatric Inpatients at Budhi Asih Region General Hospital , East Jakarta, January – December 2019.*

Diarrhea is a condition where an individual experiences bowel movements with a frequency of 3 or more per day with the consistency of feces in a liquid form, a symptom of digestive tract infections. This study aims to determine patterns of use of antidiarrheal drugs in pediatric patients at Budhi Asih Regional general Hospital, conducted retrospectively with a descriptive design using data on medical records of pediatric patients suffering from acute diarrhea who used diarrhea therapy during the January-December 2019 period. Data obtained is presented in percentage and table form. The results of the study showed that of the 110 patients with the most diarrhea, 56% are male; based on age, the most suffering from diarrhea was the age group of 1-5 years, 69%; based on the hospitalization period was in the range ≥ 3 -7 days 81.8%; and based on the type of electrolyte fluid is IVFD Asering 33.6% at the age of 1-5 years. Based on the use of drugs most often given are probiocide 85.5%; Paracetamol 73.6%; zinc 67.3%; IVFD Asering 50.9%; and the pattern of therapy that is often used is electrolyte fluid + Antipyretics + Probiotics + Supplements 26.4 %.

Keywords : Diarrhea, Pediatri, Use Of Antidiare Medicine Patte